Медскан
ГОСПИТАЛЬ НА ЯУЗЕ

ПОДГОТОВКА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ (ЭУС)

www.yamed.ru

Здоровое
отношение
к людям

ПИТАНИЕ!

1. За несколько дней до ЭУС исключите из рациона продукты, вызывающие газообразование (бобовые, капусту, газированные напитки, сдобу).

2. Если у вас нет проблем с моторикой (эвакуацией) желудка и если вы не принимаете препарат “Оземпик” и его аналоги, то:

   Накануне исследования до 19:00 можно есть, после 19:00 не есть. Пить жидкости (воду и чай) можно до 00:00. Утром в день исследования не есть, пить можно воду (сладкий чай) в объеме до 100 мл за 4 часа до исследования, не позднее!

3. Если у вас есть проблемы с моторикой (эвакуацией) желудка и если вы принимаете препарат “Оземпик” и его аналоги, то:

   Вам необходим голод (исключить пищу за 14 часов), можно принимать только жидкости: вода, чай, молоко, прозрачный бульон, протеиновый коктейль. Утром в день исследования не есть, пить можно воду (сладкий чай) в объеме до 100 мл за 4 часа до исследования, не позднее!

ИМЕТЬ ВВИДУ: Приём постоянных лекарственных препаратов (гормональных, нормализующих давление, сердечный ритм и т.д.) Разрешён, но НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 4 ЧАСА ДО ИССЛЕДОВАНИЯ!

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НЕОБХОДИМО ОТМЕНИТЬ ЗА 24 ЧАСА ДО ПРОВЕДЕНИЯ ГАСТРОСКОПИИ:

кроверазжижающие (препараты, влияющие на свертываемость крови): Ксарелто/Эликвис, Клопидогрел/Варфарин, плавикс, Препараты железа, висмута (Денол); активированный уголь; обволакивающие препараты (антациды): Альмагель, Смекта, Гевискон, Маалокс и др.

Препараты, влияющие на свертываемость крови (Ксарелто/ Эликвис, Клопидогрел/Варфарин, плавикс) не отменяйте самостоятельно. Только под контролем лечащего врача терапевта и кардиолога!

ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

1. Направление от врача!!! Это обязательное условие для проведения процедуры.

2. Данные предыдущих исследований (УЗИ, КТ, МРТ, МР-холангиографии (МРХПГ), гастроскопии (ЭГДС) и лабораторных анализов (в т.ч. диски, снимки), выписки, эпикризы и др. медицинскую документацию

3. Заключения узких специалистов (кардиолога, эндокринолога), если имеются.

4. Пациентам с бронхиальной астмой — взять с собой ингалятор.

Клинический госпитальна Яузе

+7 495 126 8150
Москва, Волочаевская, 15к1

Режим работы
Пн-пт 8:00 — 21:00
Сб-вс 8:00 — 18:00

Лучевая диагностика
Пн-ср, пт-вс 8:00 — 21:00
Чт 8:00 — 00:00

Стационар
Круглосуточно

www.yamed.ru