Медскан
ГОСПИТАЛЬ НА ЯУЗЕ

ПОДГОТОВКА К ЭЗОФАГОГАСТРО-ДУОДЕНОСКОПИИ (ЭГДС)

www.yamed.ru

Здоровое
отношение
к людям

Стандартная подготовка

Если у вас нет проблем с моторикой (эвакуацией) желудка и если вы не принимаете препарат «Оземпик» и его аналоги.

ЭГДС с 8:00 до 12:00

Утром в день исследования

Не есть, пить можно воду (сладкий чай) в объеме до 200 мл за 4 часа до исследования, не позднее!

ЭГДС с 13:00 до 16:00



Утром в день исследования
За 7 часов (не позднее) можно легкий завтрак.

> Съесть 200 г йогурта или 200 г мягкого творога, или 2 яйца (любого способа приготовления), или 2 сырника + можно чай, кофе с/без молока, можно протеиновый коктейль — все жидкости в объеме до 300 мл!

Позднее 7 часов до начала исследования. Голод! Ничего есть нельзя!

Пить можно воду (сладкий чай) в объеме до 200 мл за 4 часа до исследования, не позднее!

Если есть проблемы с моторикой желудка или вы принимаете «Оземпик» и его аналоги

Отдельно подготовка для пациентов, у которых есть проблемы с моторикой (эвакуацией) желудка, например, пациентов, принимающих «Оземпик» и его аналоги, или пациентов с подозрением на стенозы пищевода, желудка и 12-перстной кишки.

Таким пациентам необходим голод (исключить пищу за 20 часов), можно принимать только жидкости: вода, чай, молоко, прозрачный бульон, протеиновый коктейль.

За 20 часов до исследования



Что взять с собой

Вам будут нужны

- Данные предыдущих исследований (диски, снимки, заключения)
- Выписки, эпикризы
- Анализы
- Др. медицинская документация

Как принимать постоянные лекарства

Приём постоянных лекарственных препаратов (гормональных, нормализующих давление, сердечный ритм и т.д.) разрешён, **но не позднее чем за 4 часа до исследования.**

Какие препараты необходимо отменить за 24 часа

- **Кроверазжижающие** (препараты, влияющие на свертываемость крови): Ксарелто/Эликвис, Клопидогрел/Варфарин, Плавикс
- **Препараты железа, висмута** (Денол)
- **Активированный уголь**
- **Обволакивающие препараты** (антациды): Альмагель, Смекта, Гевискон, Маалокс и др.

Особые ситуации

- **Пациентам с эпилепсией** выполнение ЭГДС показано только в условиях внутривенной седации
- **Пациентам с бронхиальной астмой** необходимо взять с собой ингалятор

Клинический госпиталь на Яузе

+7 495 126 8150
Москва, Волочаевская, 15к1

Режим работы
Пн-пт 8:00 — 21:00
Сб-вс 8:00 — 18:00

Лучевая диагностика
Пн-ср, пт-вс 8:00 — 21:00
Чт 8:00 — 00:00

Стационар
Круглосуточно

www.yamed.ru